

Checklist Risico Crisisdienst

In te vullen voor het contact met patiënt

Datum:

Tijdstip:

Medewerker:

Door wie is de crisisdienst ingeschakeld?

Huisarts/CHP
GGD-arts
Collega
Patiënt zelf
Naasten van patiënten
Anderen:

Eerste inschatting toestandsbeeld/problematiek

Psychotisch
Manisch/ontremd
Persoonlijkheidsproblematiek
Depressief/ suïcidaal
Onder invloed van drank en/of drugs
Onduidelijk toestandsbeeld

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Risicoverhogende patiëntgebonden factoren?

Geen
Onbekendheid met patiënt
Eerdere agressie van patiënt
Eerder gedwongen opname(n) in verleden (gevaarcriterium)
Mogelijk paranoïde waandenkbeelden
Mogelijk imperatieve hallucinaties
Onvoorspelbaarheid door drank en/of drugs

Risicoverhogende omgevingsfactoren?

Geen
Onbekendheid met woonsituatie patiënt
Problemen in het systeem van patiënt
Mogelijk (andere) gevaarlijke personen in omgeving/intolerante buurt
Mogelijk gevaarlijke huisdieren
Mogelijk wapens in de woning of buurt van patiënt
Andere omgevingsgebonden risicofactoren, n.l.:

Hoe hoog schat je, op basis van de beschikbare informatie, de kans in dat de patiënt of diens omgeving, tijdens het consult agressief zal reageren?

Zeer laag

Zeer hoog

Zijn er preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van gevaarlijke situaties?

Meer informatie opvragen
Patiënt naar andere locatie laten komen/brengen
Patiënt zien op politiebureau
Assistentie vragen van politie tijdens consult
Afspraken maken over telefonisch contact met collega
Zorgen voor aanwezigheid van familie/kennissen
Patiënt met collega gaan zien (altijd afwegen of politie-inzet noodzakelijk is)
Anders, n.l.:

Wat is de precieze locatie waar je de patiënt gaat zien?



Indien de patiënt tijdens het consult agressie vertoont, vergeet dan niet het SOAS-formulier in te vullen!